

ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକର ପରିଚାଳନା

କ'ଣ କରିବେ ?

- ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଫସଲରେ ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ କିଆରୀରୁ ଜଳ ନିଷ୍କସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଓ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କିଆରୀରେ ପୁନର୍ବାର ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରତି ୬ ଫୁଟ ଅନ୍ତରରେ କନ୍ଦି/ପାହି ତିଆରି କରି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଦା ମୂଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ଓ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ସହଜ ହେବା ସହିତ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ।
- ଅନୁମୋଦିତ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମାତ୍ରାରେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ହସ୍ତଚାଳିତ ସ୍ତେୟର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର କୀଟନାଶକ ଦ୍ରବଣ ଓ ଶୁଦ୍ଧିଚାଳିତ ସ୍ତେୟର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୬୦-୭୦ ଲିଟର ଅନୁମୋଦିତ କୀଟନାଶକ ଦ୍ରବଣ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ସିଞ୍ଚନ ସମୟରେ ସ୍ତେୟର ନୋଜୋଲକୁ ବୁଦା ମୂଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି ପୋକଗୁଡ଼ିକ କୀଟନାଶକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ।
- ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ କୀଟନାଶକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତା ବିଧି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ।

କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ?

- ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଜାତୀୟ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଗୋଟିଏ କୀଟନାଶକକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପାଇରିଥ୍ରିଏଡ୍ (ସାଇପରମେଥ୍ରୀନ୍, ଡେଲ୍ଟାମେଥ୍ରୀନ୍), କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍, କ୍ଲିନ୍ନାଲଫସ୍, ମିଥାଲ୍ ପାରାଥ୍ରୀନ୍ ଆଦି କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହି ଜାତୀୟ ବିଷର ପ୍ରୟୋଗରେ, ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକର ବଂଶର ପୁନଃରୁଆନ ହୋଇଥାଏ ଫଳରେ ଧାନ ଫସଲର ବିଶେଷ କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଥାଏ ।
- ଧାନ ଅମଳ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଏକାଧିକ କୀଟନାଶକକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ବିନା ଅନୁମୋଦିତ କୀଟନାଶକ କୌଣସିପ୍ରକାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ଖରିଫ୍ ଧାନ ଚାଷରେ ସାଧାରଣତଃ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓ ତାଳୁଆ ଧାନ ଚାଷରେ ଏପ୍ରିଲ ରୁ ମଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକର ପାଦୁର୍କାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ପରିବେଶର ତାପମାତ୍ରା ୨୮° ରୁ ୩୦° ସେଲସିୟସ୍ ରୁ ଅଧିକ ରହିଥିବା ସମୟରେ, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କିମ୍ବା ପରିବେଶର ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହିଲେ ଏ ପୋକର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ପବନ ହେଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବିଲରୁ ଅନ୍ୟ ବିଲଗୁଡ଼ିକୁ ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ସହଜରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷଣ

ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କୀଟଗୁଡ଼ିକ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର, ଛୋଟ କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ଡେଣିଆ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । କୀଟର ଅର୍ଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମାଟିଆ ହୋଇଥାଏ । ଉଭୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ କୀଟଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଧାନକୁଦାର ମୂଳ ଭାଗରେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ହୋଇ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି ।

କ୍ଷତିର ଲକ୍ଷଣ

ଅର୍ଦ୍ଧ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଧାନ ଗଛରୁ ରସ ଶୋଷି ଖାଆନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଏହି କୀଟର ସଂକ୍ରମଣ ଧାନ କିଆରୀର ମଧ୍ୟ ଭାଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପୋକ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଧାନ ଗଛର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ । ଗଛ ଉପରେ ଏହି ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧୁ ଶିଶିର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଓ ଧାନ ଗଛ ମୂଳରୁ ରସ ଶୋଷି ଖାଇଯାଆନ୍ତି, ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଧାନ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖି ମରିଯାଏ ଏବଂ ଧାନ କେଣ୍ଡାମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ । କିଆରୀରେ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ା ହୋଇ ମରିଯାଏ । ଏହାକୁ ଗୁଣ୍ଡି ଜ୍ୱଳନ (**Hopper burn**) କୁହାଯାଏ । କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଏହି ପୋକ ଧାନ କିଆରୀର ମଧ୍ୟ ଅଂଶରୁ ହିଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ି ଆସେ ଓ ଦୂରରୁ ସମୁଦାୟ କିଆରୀଟି ପୋଡ଼ିଗଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ ।

ଧାନ କିଆରୀରେ ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗଛର ମୂଳ ଭାଗରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କୀଟନାଶକ ଅନୁମୋଦିତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

କୀଟନାଶକର ନାମ	ଏକର ପ୍ରତି ମାତ୍ରା
ଫ୍ଲୋନିକାମାଇଡ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ଜି.	୬୦ ଗ୍ରାମ୍
ପାଇମୋଡ୍ରୋକ୍ଲିନ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ଜି.	୧୨୦ ଗ୍ରାମ୍
ଡାଇନୋଟିଫ୍ଲୁରନ୍ ୨୦% ଏସ୍.ଜି.	୮୦ ଗ୍ରାମ୍
ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୧୭.୮% ଏସ୍.ଏଲ୍.	୬୦ମି.ଲି.
ଡ୍ରାକ୍ସୁମେକୋପାଇରିନ୍ ୧୦% ଏସ୍.ସି.	୧୦୦ମି.ଲି.
ଏଥପ୍ରୋକ୍ସ ୪୦% + ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୪୦% ଡବ୍ଲୁ.ଜି.	୪୦ ଗ୍ରାମ୍
ବୁପ୍ରୋପେକ୍ସିନ୍ ୨୨% + ଫିପ୍ରୋନିଲ ୩% ଏସ୍.ସି.	୨୦୦ମି.ଲି.
ଫିପ୍ରୋନିଲ ୦.୦୪% + ଥାଇମୋମେଥୋକ୍ସାମ୍ ୪% ଏସ୍.ସି.	୪୪୦ମି.ଲି.
ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୦.୦୬% + ଲସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସାନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ୦.୦୪% ଏସ୍.ସି.	୩୦୦ମି.ଲି.



ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକର ପରିଚାଳନା



ଖରିଫ୍ ଧାନରେ ସାଧାରଣତଃ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓ ତାଳୁଅ ଧାନ ଚାଷରେ ଏପ୍ରିଲ ରୁ ମଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକର ପ୍ରାବୃତ୍ତିବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ପରିବେଶର ତାପମାତ୍ରା ୨୮° ରୁ ୩୦° ସେଲସିୟସ୍ ରୁ ଅଧିକ ରହିଥିବା ସମୟରେ, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କିମ୍ବା ପରିବେଶର ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହିଲେ ଏ ପୋକର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ପବନ ହେଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବିଲରୁ ଅନ୍ୟ ବିଲଗୁଡ଼ିକୁ ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ସହଜରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷଣ

ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କୀଟଗୁଡ଼ିକ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର, ଛୋଟ କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ଡେଣିଆ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । କୀଟର ଅର୍ଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମାଟିଆ ହୋଇଥାଏ । ଉଭୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧକ କୀଟଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଧାନବୃଦ୍ଧର ମୂଳ ଭାଗରେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ହୋଇ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି ।

କ୍ଷତିର ଲକ୍ଷଣ

ଅର୍ଦ୍ଧକ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଧାନ ଗଛରୁ ରସ ଶୋଷି ଖାଆନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଏହି କୀଟର ସଂକ୍ରମଣ ଧାନ କିଆରୀର ମଧ୍ୟ ଭାଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପୋକ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଧାନ ଗଛର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ । ଗଛ ଉପରେ ଏହି ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧୁ ଶିଶିର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଓ ଧାନ ଗଛ ମୂଳରୁ ରସ ଶୋଷି ଖାଇଥାଆନ୍ତି, ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଧାନ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖି ମରିଯାଏ ଏବଂ ଧାନ କେଣ୍ଡାମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ । କିଆରୀରେ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ା ହୋଇ ମରିଯାଏ । ଏହାକୁ **ଗୁଣ୍ଡି ଜ୍ୱଳନ (Hopper burn)** କୁହାଯାଏ । କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଏହି ପୋକ ଧାନ କିଆରୀର ମଧ୍ୟ ଅଂଶରୁ ହିଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ି ଆସେ ଓ ଦୂରରୁ ସମୁଦାୟ କିଆରୀଟି ପୋଡ଼ିଗଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ ।

କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ?

- ୧) ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଜାତୀୟ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ୨) ଗୋଟିଏ କୀଟନାଶକକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ୩) ସିଡ୍ରେଟିକ୍ ପାଇରିଥ୍ରାକ୍ସ (ସାଇପରମେଥ୍ରାନ, ଡେଲ୍ଟାମେଥ୍ରାନ), କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍, କ୍ଲିଜନାଲଫସ୍, ମିଥାଇଲ୍ ପାରାଥ୍ରାକ୍ସ ଆଦି କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହି ଜାତୀୟ ବିଷର ପ୍ରୟୋଗରେ, ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକର ବଂଶର ପୁନଃରୁଆନ ହୋଇଥାଏ ଫଳରେ ଧାନ ଫସଲର ବିଶେଷ କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଥାଏ ।
- ୪) ଧାନ ଅମଳ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ୫) ଏକାଧିକ କୀଟନାଶକକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ୬) ଦିନା ଅନୁମୋଦିତ କୀଟନାଶକ କୌଣସିମତେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

କ'ଣ କରିବେ ?

- ୧) ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଫସଲରେ ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ କିଆରୀରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଓ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କିଆରୀରେ ପୁନର୍ବାର ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।
- ୨) ପ୍ରତି ୬ ଫୁଟ ଅନ୍ତରରେ ଜାରି/ପାହି ତିଆରି କରି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଦା ମୂଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଓ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ସହଜ ହେବା ସହିତ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ।
- ୩) ଅନୁମୋଦିତ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମାତ୍ରାରେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ୪) ହସ୍ତଚାଳିତ ସ୍ତେୟର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର କୀଟନାଶକ ଦ୍ରବଣ ଓ ଶକ୍ତିଚାଳିତ ସ୍ତେୟର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୬୦-୭୦ ଲିଟର ଅନୁମୋଦିତ କୀଟନାଶକ ଦ୍ରବଣ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ୫) ସିଞ୍ଚନ ସମୟରେ ସ୍ତେୟର ନୋଜେଲକୁ ବୁଦା ମୂଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି ପୋକଗୁଡ଼ିକ କୀଟନାଶକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ।
- ୬) ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ କୀଟନାଶକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ୭) କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତା ବିଧି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ।

ଧାନ କିଆରୀରେ ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକର ପ୍ରାବୃତ୍ତିବରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗଛର ମୂଳ ଭାଗରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କୀଟନାଶକ ଅନୁମୋଦିତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

କୀଟନାଶକର ନାମ	ଏକର ପ୍ରତି ମାତ୍ରା
ଫ୍ଲୋନିକାମାଇଡ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ଜି.	୬୦ ଗ୍ରାମ୍
ପାଇମୋଡ୍ରୋଜିନ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ଜି.	୧୨୦ ଗ୍ରାମ୍
ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୧୭.୮% ଏସ୍.ଏଲ୍.	୬୦ ମି.ଲି.
ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୁମେକୋପାଇରିନ୍ ୧୦% ଏସ୍.ସି.	୧୦୦ ମି.ଲି.
ଡାଇନୋଟେପ୍ଟିରାନ୍ ୧୫% + ପାଇମୋଡ୍ରୋଜିନ୍ ୪୫% ଡବ୍ଲୁ.ଜି.	୧୩୫ ଗ୍ରାମ୍
ଏଥପ୍ରୋଲ ୪୦% + ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୪୦% ଡବ୍ଲୁ.ଜି.	୪୦ ଗ୍ରାମ୍
ବୁପ୍ରୋସେଜିନ୍ ୨୨% + ଫିପ୍ରୋନାଲ ୩% ଏସ୍.ସି.	୨୦୦ ମି.ଲି.
ଫିପ୍ରୋନିଲ ୦.୦୪% + ଆକ୍ସିମେଥୋକ୍ସାମ୍ ୪% ଏସ୍.ସି.	୪୪୦ ମି.ଲି.
ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୦.୦୬% + ଲମ୍ବଡା ସାଇହାଲୋଥ୍ରାନ୍ ୦.୦୪% ଏସ୍.ସି.	୩୦୦ ମି.ଲି.

ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା **କୃଷି ସମୃଦ୍ଧି ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ୧୫୫୩୩୩** ଦେଇ ମୁକ୍ତ ଦୂରଭାଷ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା